



こあら通信

小栗小児科医院 2024年6月210号
〒933-0014 富山県高岡市野村869
TEL: 0766-23-2229
URL: http://oguri-shounika.com

水いぼ



伝染性軟属腫(水いぼ)

伝染性軟属腫は「水いぼ」と俗称される、小児に好発するウイルス性皮膚疾患です。感染経路は主にヒト-ヒト間の接触による経皮感染であるが、タオル、玩具などを介した間接的な接触も感染源になりうるとされています。

診断

肉眼診断が主です。皮膚病変は、孤立性、真珠様の、皮膚色をしたドーム型の表面平滑な丘疹および小結節をきたします。外観が水様光沢を帯びて見えるため、「水いぼ」とよばれます。大きさは直径 1~5 mm とさまざまです。しばしば中央に中心臍窩(デレ)といわれる臍状の窪みを有します。内部に白い粥状内容物が詰まっており、強くつまむと排出されます。この粥状内容物中にウイルスが存在するため、擦過などにより内容物が接触することで容易に伝播し、1~20個の病変を形成します。

治療法

1. 内容圧出法

トラコーマ撮子やピンセットを用いて、一つひとつ物理的に摘除する内容圧出法です。
この治療法は確実性が高いものの、**疼痛と出血を伴うため、疼痛やそれに対する恐怖など精神的肉体的苦痛に配慮した対応が必要になります。**

2. 液体窒素療法

液体窒素による凍結療法です。
-198℃の液体窒素に浸した綿棒または綿球を周囲の健康皮膚につかないよう押しつけ、感染細胞を破壊します。
疼痛を伴います。

3. 外用療法

銀イオン配合抗菌軟膏などを患部に塗布してください。
痛みは伴いません。
治癒までに2週間~3か月程度かかります

銀イオン配合抗菌軟膏

銀殺菌の特徴

現存する合成殺菌剤と比較すると、より広範囲の種類の殺菌に対して抗菌効果を発揮します
殺菌維持性(抗菌力・静菌力)が優れています
耐性菌ができてく
微生物には毒性を示すが、人や動物にとっては安全が極めてたかいです。

使用方法

1日2回朝入浴後に塗布してください

*この軟膏は自費診療になります

銀イオン配合抗菌軟膏での治療経過



治療前無反応期 治療中消退期 治癒

銀イオン配合抗菌軟膏の伝染性軟属腫の臨床試験結果

治療期間	0~1か月未滿	1~2か月未滿	2~3か月未滿	計
治癒症例数	6症例	28症例	34症例	68症例
治癒率	7.14%	33.3%	40.5%	80.9%

銀イオン配合軟膏の伝染性軟属腫に対する効果の検討
アトピアクリニック 稲葉先生より引用

担当: K

6月の休診

24日(月)

14:00~15:00

